

Khi Nào Thì Tôi Nên Giữ Con Mình Ở Nhà?

Triệu Chứng Của Học Sinh / Bệnh Được Chẩn Đoán	Học Sinh Có Thể Đi Học Lại Khi
Bị sốt trên 100.5 độ (đo nhiệt độ ở miệng).	Nhiệt độ dưới 100 độ (đo nhiệt độ ở miệng) trong thời gian ít nhất là 24 tiếng mà không cần uống Tylenol hoặc thuốc giảm sốt khác.
Bị lên ban hoặc phát ban cùng với sốt – mới bị hay phát ra bất ngờ.	Ban đã lặn đi. Có thư hoặc điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường.
Chảy nước mắt có màu; nước mũi màu nâu / xanh lá cây và sốt cao hơn 100.5 độ; da bị lở “có nước” (có chất dịch hoặc mọng mủ)	Không còn bị chảy nước mắt nước mũi hoặc học sinh đã uống thuốc trụ sinh trong 24 tiếng và phải có thư hoặc điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường.
Nôn Mửa	Không còn bị trong 24 tiếng
Tiêu Chảy: 3 lần đi phân lỏng hoặc nước trong một ngày.	Không còn bị trong 24 tiếng
Ho: Ho sâu, ho khan, bị sung huyết, hoặc ra đờm có màu.	Không còn bị ho nữa hoặc học sinh đã uống thuốc trụ sinh trong 24 tiếng và phải có thư hoặc điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường. Thuốc trụ sinh không công hiệu với các bệnh do vi khuẩn gây ra. Khi uống thuốc trụ sinh do bác sĩ viết toa để chữa bệnh nhiễm trùng vi khuẩn, phải uống hết tất cả số thuốc đó do bác sĩ đã cho.
Phân có màu trắng, màu đất sét, hoặc có máu	Có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường
Bị vàng da và / hoặc vàng mắt	Có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường
Nước tiểu màu nâu hoặc có máu	Có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường
Cổ bị cứng hoặc nhức đầu cùng với sốt	Không còn bị hoặc có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường
Buồn ngủ, mệt mỏi, hoặc bồn gất bất thường	Không còn bị hoặc có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường
Nhiễm trùng cuống họng do nơi chăm sóc sức khỏe chẩn đoán	Phải uống thuốc trụ sinh trong 24 giờ và phải có thư / điện thoại chấp thuận của bác sĩ gửi cho y tá nhà trường. Nếu không uống thuốc trụ sinh, hãy gọi cho y tá nhà trường trước khi cho con quý vị đi học lại.
Sau khi bị bệnh từ hai tuần trở lên, bị giải phẫu, hoặc có thay đổi khác về tình trạng sức khỏe.	Phải có giấy chỉ dẫn của bác sĩ và/hoặc phụ huynh về việc dùng thuốc hoặc những nhu cầu y tế đặc biệt cho y tá nhà trường. Gọi cho y tá nhà trường trước khi cho học sinh đi học.

RN có thể hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị về đề nghị cho con của quý vị trở lại lớp học.